

# Description de deux nouvelles espèces d'oiseaux

DE LA

## RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Un perroquet du genre **CYANOLYSEUS** et un tinamou  
du genre **CALOPEZUS**

PAR

ROBERTO DABBENE ET MIGUEL LILLO.

Le bien connu collectionneur et préparateur Mr. Louis Dinelli a envoyé dernièrement au Muséum National d'Histoire Naturelle de Buenos Aires par l'intermédiaire de Mr. Miguel Lillo, plusieurs spécimens de perroquets chassés à Colalao del Valle et à Amaicha, dans les vallées occidentales désertes et arides situées entre la Sierra de Aconquija et la Cordillère des Andes, et qui appartiennent vraisemblablement à une nouvelle espèce du genre *Cyanolyseus*, localisée dans la région andine.

Il y a quelques années Mr. Charles Ameghino avait aussi rapporté des vallées andines occidentales de la province de Catamarca, un exemplaire de cette même espèce, qui se trouve dans les collections du Muséum de Buenos Aires; et deux autres provenant respectivement de Viña, prov. de Salta (collect. G. Gerling) et de la province de San Luis, se trouvent au Muséum de La Plata.

L'habitat de cette nouvelle espèce ou forme, paraît donc confiné aux régions montagneuses de l'Ouest et du Nord-ouest de la République Argentine, tandis que le *Cyanolyseus patagonus* est distribué depuis les régions centrales au Sud et au Sud-est du Territoire et plus spécialement dans la Patagonie orientale.

**Cyanolyseus andinus** n. sp. (Pl. 10).

Diffère de *Cyanolyseus patagonus* (Vieill.) principalement par la coloration plus obscure et plus uniforme des parties inférieures et spécialement par la couleur de son ventre, cuisses, flanes et sous-caudales, qui sont d'un brun olive foncé, légèrement vert jaunâtre et sans contraste marqué avec la coloration de la poitrine, au lieu d'être jaune vif à peine nuancé de verdâtre. Le bas du dos, le croupion et les couvertures caudales supérieures sont également d'un vert olive teinté de jaunâtre au lieu du jaune vif lavé de verdâtre. Les ailes et la queue sont aussi plus longues que chez *Cyanolyseus patagonus*.

*Description*.—Front brun noirâtre; joues, côtés et sommet de la tête olive brunâtre: nuque, dos et scapulaires d'un brun légèrement lavé de verdâtre. Bas du dos, croupion et couvertures caudales supérieures vert olive avec une légère teinte de jaunâtre. De cette même couleur sont les petites et moyennes tectrices alaires. Remiges primaires bleu opaque, avec le bord interne et l'extrémité noirâtre. Secondaires d'un vert bleuâtre et leur bord interne également noirâtre. Gorge jusqu'au ventre gris brun terreneux et dépourvu du collier gris blanchâtre qu'on observe en haut de la poitrine de *Cyanolyseus patagonus*. Ventre, flanes, cuisses et couvertures caudales inférieures brun olive avec une teinte plus jaunâtre sur les flanes. Au milieu de l'abdomen une tache mal définie, plutôt transversale et d'un rouge cinabre. Cette tache est beaucoup moins étendue et moins vive que chez *Cyanolyseus patagonus*, parfois à peine indiquée dans certains spécimens. Partie inférieure du tibia de la même couleur rouge cinabre. Rectrices vert olive, nuancé de jaunâtre, plus clair à la barbe externe et brun olive à l'interne. Page inférieure des remiges et rectrices gris brun luisant. Couvertures sous-aires vert olive, lavé de jaunâtre. Quelques spécimens présentent au bord de l'aile des plumes isolées d'un jaune vif.

Bec corné foncé; iris blanchâtre; pattes blanchâtre sale.

Longueur de l'aile: 265 mm.; queue: 298 mm.; bec (suivant la ligne du culmen) 35 mm.; tarse: 23 mm.; doigt médian avec l'ongle: 38 mm.

Type: ♂ ad. Colalao del Valle, vallées Calchaquies, Tucumán, 1. xi. 1912.—  
L. Dinelli, collection de M. Lillo.

Échantillons examinés: 7, d'âge et sexe différents, dont 4 de

Amaicha et Colalao del Valle, Tucumán (collect. Lillo); un des vallées occidentales de Catamarca (collect. Mus. Nac. N.° 7063, rapporté par Mr. C. Ameghino); un de Viña, dans la partie occidentale de la province de Salta (collect. Gerling, in Mus. de La Plata) et un de la province de San Luis, sans indication de localité (collect. du Mus. de La Plata).

*Observations.*—Certains échantillons provenant des provinces de Catamarca et de Mendoza, mais sans indications des localités et qui sont conservés au Muséum de La Plata, semblent intermédiaires entre *Cyanolyseus patagonus* et la présente espèce. Ils proviennent sans doute des pentes orientales de la Cordillère et forment le passage entre les deux espèces en ce qui concerne la coloration du ventre, cuisses, sous caudales, croupion et couvertures supérieures de la queue. Ces parties ont une teinte plus claire et plus jaunâtre; sans offrir cependant la couleur vive qu'on observe dans la forme typique.

Selon Mr. Dinelli cette nouvelle espèce de perroquet est très commune dans les environs de Amaicha et Colalao del Valle. Ils sont désignés sous le nom de «loros eriollos», par les habitants de ces régions et ils ont les mêmes habitudes que leur congénère *Cyanolyseus patagonus*. Leurs nids en forme de trous de huit à neuf mètres de profondeur sont fabriqués dans des falaises presque inaccessibles.

La synonymie et la distribution géographique de cette espèce paraît donc être la suivante (1).

1882. ? *Conurus patagonus* (nec *Psittacus patagonus* Vieillot) WHITE, Proc. Zool. Soc. Lond., 1882, p. 620 (Guazan y Andalgalá, Catamarca).  
 1895. ? *Cyanolyseus patagonus* (nec Vieill.) KOSLOWSKY, Revista Mus. La Plata, VI, p. 284 (Chilecito, La Rioja).  
 1902. *Cyanolyseus patagonus* (nec Vieill.) LILLO, An. Mus. Nac. Buenos Aires, Ser. 3.<sup>a</sup>, t. I, p. 200 (Valle de Tafí; Amaicha, Tucumán).  
 1904. *Cyanolyseus patagonus* (nec Vieill.) BRUCH, Revista Mus. La Plata, XI, p. 252 (Salta; Depart. Viña—G. Gerling; vidi).  
 1905. *Cyanolyseus patagonus* (nec Vieill.) LILLO, Fauna Tucumana, Aves, in Revista de Letras y Ciencias Sociales, p. 27 (Valle de Tafí y Amaicha, Tucumán).  
 1907. ? *Cyanolyseus patagonus* (nec Vieill.) GIACOMELLI, Cat. sist. avif. Riojana, in An. Soc. Cient. Arg., t. LXIII, p. 16 (La Rioja).  
 1908. ? *Cyanolyseus patagonus* (nec Vieill.) FONTANA, Enumer. sist. aves Región Andina, p. 12.

(1) Je n'ai pas examiné les spécimens des citations marquées avec un point d'interrogation.

*Hab.* Région montagneuse des provinces occidentales de la République Argentine, depuis Salta jusqu'à San Luis.

En 1905, Mr. Miguel Lillo a publié dans «Revista de Letras y Ciencias Sociales» de Tucumán, une liste d'oiseaux de cette province, dans laquelle il fait mention d'une nouvelle espèce ou forme de tinamou («Martineta») appartenant au genre *Calopezus*, chassée par Mr. Dinelli dans les plaines de l'est de la province de Tucumán et sur les confins de celle de Santiago del Estero.

Dans le dit travail Mr. Lillo a donné le nom de *Calopezus formosus* à ce tinamou en l'accompagnant seulement d'une sommaire énumération des quelques caractères qui le distinguent de *Calopezus elegans*. Aujourd'hui nous avons décidé avec Mr. Lillo d'en donner une description plus détaillée, d'autant plus que Mr. Dinelli nous a envoyé dernièrement de Amaicha, point situé dans les vallées Calchaquies, une autre espèce ou forme qui a des affinités avec les deux espèces mentionnées et que nous désirons décrire en même temps.

#### *Calopezus formosus* LILLO. (Pl. 11).

Diffère de *Calopezus elegans* par la taille beaucoup plus forte et surtout par la couleur des parties inférieures qui sont en grande partie uniformes et seulement avec des rares barres noires sur les flancs; par le différent style de coloration des parties supérieures et par des grandes taches noires sur les couvertures des ailes, sur la poitrine et le devant du cou.

*Description.*—♂. (Pl. 11, fig. 1). Sommet de la tête et huppe brun cendré, chaque plume avec une ligne centrale et longitudinale noire. Côtés de la tête et du cou fauve clair lavé de grisâtre sur la partie postérieure du cou et parsemé de petites taches noires.

Deux larges bandes blanches parallèles sur les côtés du cou, une commençant derrière l'oeil et l'autre, plus courte, de la base du bec. Menton et gorge blanches. Épaules, dos et croupion gris fauve, parsemé de taches fauve clair et les plumes traversées par d'étroites lignes noires. Chaque plume (Pl. 11, fig. 1, a.) a une grande tache transversale fauve clair, plus élargie au milieu et bordée de noir.

le reste traversé par des petites barres de la même couleur sur un fond gris fauve.

Tectrices alaires fauve clair avec des grandes taches noires de forme irrégulière présentant ensemble une coloration plus claire que le dos.

Les remiges primaires ont la barbe externe noire coupée régulièrement par des taches fauve clair, qui occupent toute la barbe. La barbe interne brun clair uniforme dans la moitié apicale et zébrée de lignes transversales souvent irrégulières fauve clair dans la moitié basale.

Secondaires fauves, traversées par des bandes noirâtres et variées de vermiculations de la même couleur dans les parties claires. Rectrices à bandes noires et fauves avec les couvertures de la même couleur du dos.

Bas du cou et haut de la poitrine gris fauve parsemé de taches noires et fauve clair, variées de petites lignes irrégulières brunes et noires. Poitrine d'un blanc de crème lavée légèrement de fauve clair et chaque plume traversée par des bandes noires assez larges au milieu, ce qui donne à l'ensemble un aspect tacheté. Presque de la même couleur sont les flancs où souvent les plumes ont une ligne noire longitudinale unie sur les côtés à des bandes transversales en forme de croissant et de la même couleur. Bas de la poitrine, ventre et crissum d'un fauve clair uniforme, beaucoup plus pâle sur le milieu.

Bec corné, avec la mandibule claire; iris châtain; pattes gris bleuâtre.

Longueur totale (du spécimen en peau): 430 mm.

Aile: 238 mm.; queue: 123 mm.; bec: 30 mm.; tarse: 50 mm.; doigt médian: 38 mm.

Type: ♂ ad. Entre Las Cejas et Isea Tacú (F. C. C. N.) sur les confins de Tucumán et Santiago del Estero, 1905.—L. Dinelli in collection M. Lillo, Tucumán.

♀. (Pl. 11, fig. 2.).—Diffère du mâle par la taille un peu plus forte et par la disposition et forme des taches du dos, du cou et de la poitrine.

*Description.*—Des épaules à la queue, le fond de la coloration est plus fauve et moins gris que chez le mâle; aussi plus finement vermiculée de noir. Chaque plume (Pl. 11, fig. 2, b.) a sur le milieu une grande tache fauve en forme de cœur, entourée de noir et les barbes traversées par de petites barres ou vermiculations de la même

couleur. Des petites et nombreuses taches rondes fauve clair se trouvent aussi sur le bord de la plume, ce qui donne à l'ensemble du plumage du dos un apparence finement et régulièrement mouche-tée.

Les plumes du cou et du haut de la poitrine ont une ligne longitudinale noire assez large, bordée de chaque côté par une ligne fauve, avec des petites barres transversales brunes sur les barbes. Les plumes de la poitrine sont traversées par des lignes noires en forme de croissant.

Bec corné, avec la mandibule gris clair et la pointe noirâtre; iris châtain; pattes gris bleuâtre pâle.

Longueur totale (sur la peau) 450 mm.

Aile: 251 mm.; queue: 127 mm.; bec: 32 mm.; tarse: 55 mm.; doigt médian: 40 mm.

Type: ♀ ad. Isea Iacú, Santiago del Estero, 1905.—L. Dinelli, collection M. Lillo, Tucumán.

Spécimens examinés de *Calopezus formosus*: 6 dont deux mâles et une femelle de la collection du Muséum National de Buenos Aires, N.º 8148, chassés par Mr. P. Girard, à Suncho Corral, Santiago del Estero.

L'autre tinamou que Mr. Dinelli a envoyé, appartient également au genre *Calopezus* et a été chassé à Colalao del Valle, dans la région aride des vallées Calchaquies situées à l'ouest de la province de Tucumán.

Ce tinamou présente, comme nous l'avons dit, des caractères de transition entre *Calopezus elegans* et *Calopezus formosus*.

Cette nouvelle espèce, ou peut-être race intermédiaire, qui paraît localisée dans les régions montagneuses du Nord-ouest de la République Argentine, nous la distinguerons avec le nom de:

### ***Calopezus intermedius* n. sp. (Pl. 12.).**

Diffère de *Calopezus elegans* par la couleur des parties inférieures, lesquelles sont, depuis le bas de la poitrine au crissum, presque entièrement d'un fauve clair uniforme et seulement avec des rares barres sur les flancs; et de *Calopezus formosus* par la taille beau-

coup plus petite et par la forme des barres et des stries des plumes du devant du cou et du haut de la poitrine. Ces stries et ces petites barres transversales sont plus fines et présentent la même disposition qu'on observe chez *Calopezus elegans*.

*Description.*—Le fond de la couleur des parties supérieures est d'un fauve grisâtre, moucheté de taches fauve clair et noires avec des vermiculations brunes. Chaque plume (Pl. 12, fig. c.) présente à peu près le même dessin qu'on observe dans celles de la femelle de *C. formosus*, mais les taches fauves sont beaucoup plus pâles.

Les couvertures des ailes sont presque comme chez *Calopezus elegans*, et en diffèrent seulement par la plus grande largeur des lignes noires. Les remiges primaires ont des lignes et des points blanchâtres presque sur toute la barbe interne. Les barres ou lignes noires qui se trouvent sur les côtés de la poitrine et sur les flancs sont plus ondulées que chez les autres deux espèces de tinamou.

Bec corné à mandibule grisâtre; iris café clair; tarse gris blennâtre.

Longueur totale (exemplaire en peau): 410 mm. Aile: 233 mm.; queue: 120 mm.; bec.: 28 mm.; tarse: 45 mm.; doigt médian: 35 mm.

Type: ♂ ad. Colalao del Valle, Ouest de la Province de Tucumán, 27. XI, 1912.—L. Dinelli, collection M. Lillo, Tucumán.

Selon Mr. Dinelli cette espèce se rencontre dans la région montagneuse depuis 2500 mets. d'altitude et paraît assez abondante dans les environs de Colalao del Valle et Amaicha, province de Tucumán. Il ajoute qu'ils vont par petites troupes de huit à dix individus cherchant leur nourriture parmi les rares arbustes de ces régions désolées. Ils font leur nid au pied de ces arbustes et leur ponte est de huit à dix oeufs d'un vert clair luisant.

Il est possible que *Calopezus intermedius* et *Calopezus formosus* représentent seulement des formes géographiques de *Calopezus elegans*, unique espèce du genre qui était connue jusqu'à présent. Cependant il existe au Muséum de La Plata un échantillon identique au type que nous venons de décrire et qui porte une étiquette avec la provenance de la prov. de Buenos Aires. Mais il est fort douteux que cette provenance soit exacte; ce doit être une erreur et ce spécimen provient sans doute de Chilecito (La Rioja).

Dans tous les cas la synonymie et la distribution connue des trois tinamous est la suivante:

1. *Calopezus elegans* (Lafr. et D'Orb.).

*Eudromia elegans* LAFRESNAYE et D'ORBIGNY, Syn. Av., II (1832) el. 2. Pl. (Patagonia oriental).

*Calopezus elegans* SALVADORI, Cat. Birds Brit. Mus., XXVII (1895), p. 566; SHARPE, Hand-List of Birds, I, (1889), p. 12; BRABOURNE et CHUBB, Birds South America, vol. I, (1912), p. 7.

*Distrib.*—Plaines de la partie orientale des provinces de San Juan et Mendoza; provinces de San Luis, Córdoba et Sud de Buenos Aires. Au Sud, Patagonie orientale jusqu'au Chubut.

2. *Calopezus intermedius* n. sp.

1895. ? *Calodroma elegans* (nec *Eudromia elegans* Lafresnaye et D'Orbigny) KOSLOWSKY, Revista Mus. La Plata, VI, p. 287. (Chilecito, La Rioja).

1902. *Calopezus elegans* (nec Lafr. et D'Orb.) LILLO, An. Mus. Nac. Buenos Aires, ser. 3, t. 1, p. 219 (Valles Calchaquíes, Tucumán—*Budin*).

1907. ? *Calopezus elegans* (nec Lafr. et D'Orb.) GIACOMELLI, Cat. sist. avif. Riojana, in An. Soc. Cient. Arg., t. LXIII, p. 24.

1910. ? *Calopezus elegans* (nec Lafr. et D'Orb.) DABBENE, An. Mus. Nac. Buenos Aires, ser. 3, t. XI, p. 188 (part.: ? Chilecito, La Rioja—*Koslowsky*).

*Distrib.*—Vallées andines, de la partie occidentale des provinces de Tucumán (Colalao del Valle et Amaicha—*Budin*, *L. Dinelli*) et de La Rioja (?Chilecito—*Koslowsky*).

3. *Calopezus formosus* LILLO.

1905. *Calopezus formosus* LILLO, Fauna Tucumana, Aves, in Revista de Letras y Ciencias Sociales, Tucumán, p. 39

1910. *Calopezus formosus* DABBENE, An. Mus. Nac. Buenos Aires, ser. 3, t. XI, p. 188, N.º 19; BRABOURNE et CHUBB, Birds South America, vol. I, (1912), p. 7.

*Distrib.*—Plaines de la partie orientale de la province de Tucumán et Nord-ouest de la province de Santiago del Estero: Iscá Iacú et Suncho Corral—*L. Dinelli* et *P. Girard*.